

09 a 12 de agosto de 2021

Autores: Monica Amorim De Oliveira, Andrea Ferreira Haddad, Alessandra Godomiczer, Cristiane Perlingeiro Comarck Ferraz, Claudio Vieira De Carvalho, Angélica Dias De Barros Cerqueira, Priscila Oliveira Diaz, Katarina Cardoso Rodrigues, Fernanda Pereira Barbosa, Vanessa Pinheiro De Queiroz

Hospital Unimed-Rio – contato: monicamorim@gmail.com

Introdução:

Hospitalização aumenta em 8x o risco de tromboembolismo venoso (TEV), que podem ter consequências clínicas importantes como trombose venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP), além de promover aumento do tempo de internação hospitalar e morte.

Objetivos:

Avaliar dados de pacientes que apresentaram eventos tromboembólicos no período de 01/01/20 a 14/03/21 e foram a óbito em hospital quaternário privado.

Métodos:

Análise prospectiva de prontuário de Pacientes admitidos no período de 01/01/20 a 14/03/21, para internação clínica e cirúrgica, feito estratificação de risco para TEV e instituído profilaxia de acordo com o risco.

Resultados:

No período descrito ocorreram 126 eventos, sendo 120 (92,5%) TVP e 6 (4,8%). A média de idade foi de $70,8 \pm 12,3$ anos. A distribuição da faixa etária está na tabela 1.

74 dos pacientes (58,7%) eram do sexo masculino e a média de IMC foi de $29,6 \pm 6,4$ Kg/m².

Os fatores de risco mais encontrados foram idade > 65 anos (89,7%), imobilidade ou acamado (49,2%), neoplasia (13,6%) e cirurgia ou trauma (11.1%).

Dentre os pacientes que apresentaram TEV durante a internação, 63,5% foram internados em decorrência de infecção por COVID-19 (figura 1), 35% permaneceram hospitalizados por 7-29 dias (gráfico 1) e 49 pacientes (38,9%) foram a óbito.

Conclusões:

TEV é uma condição frequente em pacientes internados e estão relacionados com maior tempo de permanência hospitalar e mortalidade intra-hospitalar. COVID 19 aumentou a frequência de TEV e a idade foi um importante fator de risco para seu desenvolvimento.

Tabela 1. Faixa etária

Faixa etária anos	Alta (N= 75) % (N)	Óbito (N = 48) % (N)	População total (N= 126)	P
Até 35	0,8% (1)	0	0,8% (1)	NS
36-45	4% (5)	0,8% (1)	4,8%(6)	
46-55	1,6% (2)	4% (5)	5,6% (7)	
56-65	12,7% (16)	4,8% (6)	17,5% (22)	
66-75	18,3% (23)	14,3% (18)	32,5% (41)	
76-85	19,8% (25)	9,5% (12)	29,4% (37)	
86-95	4% (5)	4,8% (6)	8,8% (11)	
>95%	0	0,8% (1)	0,8% (1)	

Gráfico 1




Figura 1

