

Fatores de risco cardiovascular e mortalidade por COVID-19

VALDILENE LIMA SILVA, ILIANA REGINA RIBEIRO MENEZES, ANNY DE SOUSA AZEVEDO, DAVID FERNANDES PEDRO PEREIRA, LETICIA DE SOUSA PERES, THIAGO MOREIRA BASTOS DA SILVA, GIOVANNI POSSAMAI DUTRA, BRUNO FERRAZ DE OLIVEIRA GOMES, JOAO LUIZ FERNANDES PETRIZ, GLAUCIA MARIA MORAES OLIVEIRA

Introdução:

Alguns estudos demonstram uma maior prevalência de óbitos em portadores de fatores de risco cardiovascular (FRC) durante a internação por COVID-19.

Método:

Estudo retrospectivo com pacientes admitidos em terapia intensiva e diagnóstico confirmado de COVID-19 por RT-PCR e com pelo menos uma dosagem de troponina durante a internação. Foram avaliados os fatores de risco tradicionais: história da doença cardiovascular estabelecida (infarto, AVC ou doença arterial periférica), diabetes, doença renal crônica com clearance <60ml/min, hipertensão, tabagismo, dislipidemia ou idade > 65 anos.. Desfecho primário deste estudo foi morte hospitalar e secundário foi composto por morte hospitalar, injuria miocárdia e intubação orotraqueal. Foi avaliada a ocorrência destes desfechos conforme o numero de fatores de risco.

Resultados:

Foram incluídos 236 pacientes , média idade = 61,14 +ou - 16,2 anos, com 63,1% homens, 55,5% hipertensos e 33,1% diabéticos. Observou-se o aumento significativo do desfecho primário conforme aumento do número de fatores risco(0FRC: 5,9%; 1 FRC: 17,5%. 2FRC1;32,2% e > 3FRC:41,2%; p=0,001). O mesmo foi observado para desfecho secundário(0 FRC: 5,9%; 1 FRC: 17,5%; 2 FRC:32,2% e > 3 FRC: 41,2%; p=0,001).

Conclusão:

Pacientes com maior número de fatores de risco cardiovascular, apresentaram maior ocorrência de morte hospitalar, injuria miocárdica e intubação orotraqueal.

Ocorrência de eventos conforme o número de fatores de risco

