

## **Tromboembolismo e mortalidade intra-hospitalar tendo como fator de risco a idade**

MONICA AMORIM DE OLIVEIRA, ANDREA FERREIRA  
HADDAD, ALESSANDRA GODOMICZER, CRISTIANE PERLINGEIRO  
CORMACK, CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO, ANGÉLICA DIAS DE  
BARROS CERQUEIRA, PRISCILA OLIVEIRA DIAZ, VANESSA PINHEIRO  
DE QUEIROZ, KATARINA CARDOSO RODRIGUES e FERNANDA PEREIRA  
BARBOSA

Hospital Unimed Rio, , , .

A hospitalização aumenta em 8x o risco de tromboembolismo venoso (TEV), que podem ter consequências clínicas importantes como trombose venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP), além de promover aumento do tempo de internação hospitalar e morte.

Comparamos os dados de eventos tromboembólicos com a coorte histórica.

Foram avaliados pacientes admitidos de maneira consecutiva em hospital quaternário privado de 01 de janeiro de 2020 a 14 de março de 2021, para internação clínica e cirúrgica por pelo menos 48 h. Todos foram avaliados de acordo a estratificação de risco para TEV pelo médico e a profilaxia instituída de acordo com o risco encontrado. Foram excluídos da análise, pacientes admitidos com TVP e/ou EP, eventos de trombose arterial e aqueles em cuidados paliativos. Foram registrados os eventos de TVP (distal e proximal), trombose de dispositivos (PICC e AVP) e EP. Estes desfechos foram confirmados com exames de imagem. No período de jan 20 a mar 21 ocorreram 126 eventos, dentre os pacientes internados. Dentre estes, 120 (95,2%) foram por TVP e 06 (4,8%) por TEP. 48 pacientes foram a óbito, correspondendo a 38,1% dos pacientes que apresentaram TEV dentro da mortalidade intra-hospitalar. A maioria eram homens. A média de idade foi 70,8 +/- 12,3 anos e a mediana 71 (64-80). Faixa etária <35 anos: 1 (0,8%), 36-45 anos: 6 (4,8%), 46-55 anos: 7 (5,6%), 56-65 anos: 22 (17,5%), 66-75 anos: 41 (32,5%), 76-85 anos: 37 (29,4%), 86-95 anos: 11 (8,8%), > 95 anos: 1 (0,8%). **Fatores de Risco:** Acesso venoso profundo: 10 (7,94%), Cirurgia ou trauma: 14 (11,11%), Gravidez/ Puerpério: 0, **>65 anos: 96 (89,72%),** Imobilidade / acamado: 62 (49,2%), Neoplasia 17 (13,6%), PICC: 01 (0,79%), Trombofilia: 02 (1,59%), Uso de Estrogênio: 01 (0,79%), Viagem longa: 0