

Nosso objetivo é quebrar barreiras para proteger cada vez mais pacientes

Mais da metade dos lares brasileiros são de famílias mais pobres ou sem renda e ainda, metade da população brasileira vive com menos de um salário mínimo

Quanto mais conhecemos nossos pacientes, maior é o nosso foco no que importa!

Fontes, acesso em 30 de março de 2020.

<https://exame.abril.com.br/economia/major-parte-das-novas-vagas-de-trabalho-e-de-ate-2-salarios-minimos/>

<https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/27/renda-domiciliar-per-capita-no-brasil-foi-de-r-1373-em-2018-mostra-ibge.ghtml>

<https://odia.ig.com.br/conteudo/economia/2017-11-29/ibge-metade-da-populacao-brasileira-vive-com-menos-de-um-salario-minimo.html>

*Dado fictício, meramente ilustrativo, não retirado de publicação científica..

PP-XAR-BR-0339-1



MAIS 1408*
PRATOS DA VOVÓ

**PROTEÇÃO COMEÇA COM
VOCÊ!**

Mais Proteção para Mais Pacientes!

55%
de
desconto

para pacientes inscritos no Cadastro Único
(CadÚnico)* com comprovação de renda de até 3
salários mínimos totais

Para as apresentações de Xarelto®

10mg 30cp, 15mg 28cp, 20mg 28cp



* Cadastro Único (ou CadÚnico): iniciativa do governo Federal para identificar e conhecer as famílias brasileiras de baixa renda e reunir informações em um sistema único, para implementação de políticas públicas capazes de promover melhoria na vida dessas famílias. Consulte termos e condições no site BPV.

RESTRICTED

Como o paciente pode participar da campanha?

1

Cadastro no programa

O paciente precisará se cadastrar no programa **Bayer para Você** pelo site

www.bayerparavoce.com.br



2

Envio dos comprovantes

Dentro da página da campanha, o paciente precisará enviar dois documentos (digitalizado ou foto de boa qualidade):

- Prescrição médica de Xarelto 10mg 30cp, 15mg 28cp ou 20mg 28cp, com data de até 6 meses
- Certidão do Cadastro Único (documento oficial) com data de atualização igual ou inferior 2 anos.

3

Análise dos comprovantes

A equipe do Bayer para Você irá analisar os comprovantes em **até 2 dias úteis** e entrar em contato via telefone ou email cadastrado.

4

Documentos aprovados

Após a **aprovação, o paciente já tem acesso aos 55% de desconto em Xarelto***. Basta ele ir à farmácia de preferência, fornecer o CPF e realizar a compra com o desconto.

*nas apresentações de 10mg 30cp, 15mg 28cp ou 20mg 28cp



XARELTO®: Rivaroxabana 2,5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg. REG. MS 1.7056.0048. INDICAÇÕES: Xarelto® 10 mg, 15 mg e 20 mg: Prevenção de acidente vascular cerebral (AVC) e embolia sistêmica em pacientes adultos com fibrilação atrial não valvar (FANV). Tratamento de trombose venosa profunda (TVP) e prevenção de TVP e embolia pulmonar (EP) recorrentes após TVP aguda, em adultos. Tratamento de EP e prevenção de EP e TVP recorrentes, em adultos. Prevenção de tromboembolismo venoso (TEV) em pacientes adultos submetidos à cirurgia eletiva de artroplastia de joelho ou quadril. Xarelto® 2,5 mg, coadministrado com ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg: Prevenção de eventos aterotrombóticos (AVC, infarto do miocárdio e morte cardiovascular) em pacientes adultos com doença arterial coronariana (DAC) ou doença arterial periférica (DAP) sintomática em alto risco de eventos isquêmicos. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer excipiente; sangramento ativo clinicamente significativo; doença hepática associada à coagulopatia; gravidez e lactação. Tratamento concomitante de DAC/DAP com AAS em pacientes com AVC hemorrágico ou lacunar prévio ou qualquer AVC dentro de um mês. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Tratamento sistêmico concomitante com antimicóticos azólicos ou inibidores das proteases do HIV, potentes inibidores do CYP3A4 e da gp-p; comprometimento renal grave (ClCr <15 ml/min). Válvulas cardíacas prostéticas. Deve ser interrompido antes de intervenção ou cirurgia. Xarelto® 2,5 mg duas vezes ao dia não é indicado em associação com terapia antiplaquetária dupla. USO COM CAUTELA: Pacientes com insuficiência renal moderada (ClCr < 50-30 mL/min) ou grave (ClCr < 30-15 mL/min); recebendo medicações concomitantes que levam ao aumento da concentração de rivaroxabana no plasma em pacientes tratados, como inibidores potentes do CYP3A4; risco elevado de sangramento, doença gastrointestinal ulcerativa; monitoramento clínico de acordo com as práticas de anticoagulação é recomendado durante todo o período de tratamento. Anestesia neuraxial (epidural/espinal). EVENTOS ADVERSOS: anemia, tontura, cefaléia, síncope, hemorragia ocular, taquicardia, hipotensão, hematoma, epistaxe, hemorragia do trato gastrointestinal e dores abdominais, dispepsia, náusea, constipação, diarreia, vômito, prurido, erupção cutânea, equimose, dor em extremidades, hemorragia do trato urogenital, febre, edema periférico, força e energia em geral reduzidas, elevação das transaminases, hemorragia pós- procedimento, contusão. POSOLOGIA: Prevenção de AVC em FANV: 20 mg uma vez ao dia. Pacientes com disfunção renal moderada (ClCr < 50-30 mL/min) ou grave (ClCr < 30-15 mL/min): 15 mg uma vez ao dia. Pacientes submetidos a intervenção coronária percutânea (ICP) com colocação de stent: 15 mg de Xarelto® uma vez ao dia (ou 10 mg de Xarelto® uma vez ao dia, se insuficiência renal moderada {ClCr < 50-30 mL/min}) associado a um inibidor de P2Y12 por no máximo 12 meses após a ICP com colocação de stent. Tratamento do TEV: o tratamento inicial de TVP e EP agudas é de 15 mg duas vezes ao dia para as três primeiras semanas, seguido por 20 mg uma vez ao dia. Após pelo menos 6 meses, 10 ou 20 mg uma vez ao dia, com base em uma avaliação de risco individual. Xarelto® 15 e 20 mg devem ser ingeridos com alimentos. Profilaxia de TEV após artroplastia de quadril (ATQ) e joelho (ATJ): 10 mg uma vez ao dia, com ou sem alimento. Os pacientes devem ser tratados por 5 semanas após ATQ ou por duas semanas após ATJ. A dose inicial deve ser tomada 6 a 10 horas após a cirurgia, contanto que tenha sido estabelecida a hemostasia. Xarelto® 2,5 mg 2 vezes ao dia pode ser tomado com ou sem alimentos. Produto medicinal sujeito a prescrição médica (CÓD: XAR 2020-03-26-167) Para informações completas, vide bula do produto (Xarelto 2,5mg: VE0320-CCDS14p Xarelto 10mg: VE0319-CCDS14 Xarelto 15mg e 20mg: VE0219-CCDS11)

CONTRAINDICAÇÃO: DOENÇA HEPÁTICA ASSOCIADA À COAGULOPATIA.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: ANTIMICÓTICO AZÓLICO DE USO SISTÊMICO. PP-XAR-BR-0339-1