

Confiança Dose certa




O **X** **da questão**
Qualidade Acesso e Adesão

Xarelto® possui um um amplo programa de estudos de anticoagulação em pacientes com CAT*

CALLISTO (*Cancer Associated thrombosis – expLoring soLutions for patlentS through Treatment and prevention with rivarOxaban*) é um programa abrangente que envolve múltiplos estudos clínicos paralelos, registros de casos, recomendações de especialistas e uso em diversos cenários clínicos para preencher importantes lacunas no conhecimento do uso de Xarelto® em pacientes com câncer.

Estudos incluídos no programa CALLISTO¹



PORQUE DOENÇAS SÉRIAS MERECEM EVIDÊNCIAS ROBUSTAS

Referências

1. Khorana, Weitz. Treatment Challenges in Venous Thromboembolism: An Appraisal of Rivaroxaban Studies. *Thromb Haemost* 2018;118 (Suppl 1):S23-S33. 2. CASSINI: Khorana AA et al, *N Engl J Med* 2019;380(8):720-8. 3. SELECT-D: Young AM et al. *J Clin Oncol* 2018; 36(20):2017-2023. 4. PRO-LAPS-II: PRO-LAPSII ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03055026. Available at: <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03055026>; Accessed January 31, 2018. 5. CASTA-DIVA: NCT02746185. 6. CONKO-011: Riess H et al. *Dtsch med Wochenschr* 2015;140(S 01):S22-S23; NCT02583191. 7. COSIMO: Picker N et al *Thrombosis and Haemostasis* 2020; <https://doi.org/10.1055/s-0040-1714739>. 8. QAI: Mantha S, et al. *J Thromb Thrombolysis* 2017;43(02):166-171.

*CAT, trombose associada a câncer;

XARELTO®: Rivaroxabana 2,5 mg/10 mg/15 mg/20 mg. REG. MS 1.7056.0048. INDICAÇÕES: Xarelto® (rivaroxabana) 10 mg, 15 mg e 20 mg: Prevenção de acidente vascular cerebral (AVC) e embolia sistêmica em pacientes adultos com fibrilação atrial não valvar (FANV). Tratamento de trombose venosa profunda (TVP) e prevenção de TVP e embolia pulmonar (EP) recorrentes após TVP aguda, em adultos. Tratamento de EP e prevenção de EP e TVP recorrentes, em adultos. Prevenção de tromboembolismo venoso (TEV) em pacientes adultos submetidos à cirurgia eletiva de artroplastia de joelho ou quadril. Xarelto® (rivaroxabana) 2,5 mg, coadministrado com ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg: Prevenção de eventos aterotrombóticos (AVC, infarto do miocárdio e morte cardiovascular) em pacientes adultos com doença arterial coronariana (DAC) ou doença arterial periférica (DAP) sintomática em alto risco de eventos isquêmicos. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer excipiente; sangramento ativo clinicamente significativo; doença hepática associada à coagulopatia; gravidez e lactação. Tratamento concomitante de DAC/DAP com AAS em pacientes com AVC hemorrágico ou lacunar prévio ou qualquer AVC dentro de um mês. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Xarelto® não é recomendado para trombopprofilaxia em pacientes que foram recentemente submetidos a substituição da válvula aórtica transcaterter (TAVR). Não há dados em pacientes com válvulas cardíacas prostéticas. Xarelto® 2,5 mg duas vezes ao dia não é indicado em associação com terapia antiplaquetária dupla. Deve ser interrompido antes de intervenção ou cirurgia. Xarelto® não é recomendado em pacientes com antecedentes de trombose diagnosticados com síndrome antifosfolípide e com persistência tripla positiva. Comprometimento renal grave (ClCr < 15 ml/min). Tratamento sistêmico concomitante com antimicóticos azólicos ou inibidores das proteases do HIV, potentes inibidores do CYP3A4 e da gp-p. O benefício individual do tratamento antitrombótico deve ser avaliado em relação ao risco de sangramento em pacientes com câncer ativo. USO COM CAUTELA: Pacientes com insuficiência renal moderada (ClCr < 50-30 mL/min) ou grave (ClCr < 30-15 mL/min); recebendo medicações concomitantes que levam ao aumento da concentração de rivaroxabana no plasma em pacientes tratados, como inibidores potentes do CYP3A4; risco elevado de sangramento, doença gastrointestinal ulcerativa; monitoramento clínico de acordo com as práticas de anticoagulação é recomendado durante todo o período de tratamento. Anestesia neuraxial (epidural/espinal). Pacientes com peso corporal baixo (≤ 60 kg) quando coadministrado com AAS. EVENTOS ADVERSOS: anemia, tontura, cefaléia, síncope, hemorragia ocular, taquicardia, hipotensão, hematoma, epistaxe, hemorragia do trato gastrointestinal e dores abdominais, dispepsia, náusea, constipação, diarreia, vômito, prurido, erupção cutânea, equimose, dor em extremidades, hemorragia do trato urogenital, febre, edema periférico, força e energia em geral reduzidas, elevação das transaminases, hemorragia pósprocedimento, contusão. POSOLOGIA: Prevenção de AVC em FANV: 20 mg uma vez ao dia. Pacientes com disfunção renal moderada (ClCr < 50-30 mL/min) ou grave (ClCr < 30-15 mL/min): 15 mg uma vez ao dia. Pacientes submetidos a intervenção coronária percutânea (ICP) com colocação de stent: 15 mg de Xarelto® uma vez ao dia (ou 10 mg de Xarelto® uma vez ao dia, se insuficiência renal moderada {ClCr < 50-30 mL/min}) associado a um inibidor de P2Y12 por no máximo 12 meses após a ICP com colocação de stent. Tratamento do TEV: o tratamento inicial de TVP e EP agudas é de 15 mg duas vezes ao dia para as três primeiras semanas, seguido por 20 mg uma vez ao dia. Após pelo menos 6 meses: 10 ou 20 mg uma vez ao dia, com base em uma avaliação de risco individual. Xarelto® 15 e 20 mg devem ser ingeridos com alimentos. Profilaxia de TEV após artroplastia de quadril (ATQ) e joelho (ATJ): 10 mg uma vez ao dia, com ou sem alimento. Os pacientes devem ser tratados por 5 semanas após ATQ ou por duas semanas após ATJ. A dose inicial deve ser tomada 6 a 10 horas após a cirurgia, contanto que tenha sido estabelecida a hemostasia. A dose recomendada para pacientes no regime vascular com DAC ou DAP é de 1 comprimido de 2,5 mg de Xarelto® duas vezes ao dia em associação com dose diária de 100 mg AAS. A duração do tratamento deve ser determinada para cada paciente com base em avaliações regulares. Xarelto® 2,5 mg pode ser tomado com ou sem alimentos PRODUTO DE VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARA INFORMAÇÕES COMPLETAS, VIDE BULA DO PRODUTO. VERSÃO: XAR 2021-03-11-201.

CONTRAINDICAÇÃO: DOENÇA HEPÁTICA ASSOCIADA À COAGULOPATIA.

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: ANTIMICÓTICO AZÓLICO DE USO SISTÊMICO.

Conheça e divulgue para seus pacientes

 **bayer**
para **você**

O programa de **benefícios e descontos** da Bayer.

até **50%** de desconto

Na compra de  **Xarelto**
rivaroxabana

Para informações completas consulte www.bayerparavoce.com.br.

MATERIAL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A PROFISSIONAIS DE SAÚDE HABILITADOS A PRESCREVER OU DISPENSAR MEDICAMENTOS. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O SEU COMPARTILHAMENTO COM DEMAIS PÚBLICOS.

